



TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE FISSURA LABIOPALATINA COMPLETA UNILATERAL: RELATO DE CASO

De Marins L.Y.^{1*}; Bastos-Júnior J.C.C.²


1. Graduando, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru - SP
2. Hospital de Habilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru - SP

INTRODUÇÃO


Fissuras labiopalatais (FLP) são malformações congênitas comuns que podem afetar o lábio e o palato de diferentes formas. Seu **diagnóstico** é realizado por exames de imagem no período pré-natal e o **tratamento** é dividido em etapas terapêuticas de acordo com a idade, o crescimento e a amplitude da fissura, contando com a atuação de diversos profissionais e especialidades.

DESCRIÇÃO DO CASO


1. Queiloplastia 5m. 2. Palatoplastia 1a.3m.



3. Expansão de maxila 9a.7m.



A. Inicial. B. Expansor ativado (borboleta). C. Contenção rígida.



4. Enxerto ósseo alveolar 15a.11m.




5. Alinhamento dentário e sem compensação
Preparo ortodôntico cirúrgico





6. Exodontia do 38 e 48. 18a.

ANTES



DEPOIS



7. Cirurgia Ortognática 19a. 9m.



8. Acompanhamento pós ortognática de 18 meses (A) e 24 meses (B e C).

DISSCUSÃO E COMENTÁRIOS FINAIS

- A **análise facial** deve respeitar o crescimento ósseo para maior precisão terapêutica.
- O tratamento é **individualizado** conforme tempo cirúrgico, complexidade e crescimento ósseo.
- Indica-se intervalo mínimo de 6 meses entre **exodontia** e cirurgia ortognática, evitando complicações e imprecisões.
- O **planejamento digital** aumenta a previsibilidade, otimiza o tempo e melhora a comunicação com o paciente.
- O **manejo multidisciplinar** é essencial para o tratamento, garantindo assim a correção anatômica e a melhora da qualidade de vida e da autoestima da paciente.

REFERÊNCIAS

