

INTRODUÇÃO

A osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos (OMAM) é uma condição clínica grave, caracterizada pela exposição dos ossos maxilares, que acomete pacientes submetidos a terapias com medicações anti reabsorptivas e antiangiogênicas. É um quadro que pode evoluir para dor intensa, infecções recorrentes, fístulas extraorais, fraturas patológicas e, em estágios mais avançados, necessidade de ressecções ósseas extensas.

DESCRIÇÃO DO CASO



Sexo feminino,
melanoderma



anos de idade



CA de mama com
metástase óssea



Ácido
zoledrônico



Dificuldade para
remover prótese



Fig. 1 - Extensa exposição óssea no rebordo alveolar superior, associada a secreção purulenta.




Fig. 2 - Reconstrução volumétrica evidenciando redução difusa do processo alveolar da maxila.



Fig. 3 - Desbridamento cirúrgico do osso necrosado e descontaminação local, sob anestesia geral.



Fig. 4 - Após 8 meses, progressão da exposição óssea associada a infecções recorrentes.




Fig. 5 - Reconstrução volumétrica pós-operatória.



Fig. 6 - Novo desbridamento cirúrgico com mínimo descolamento mucoperiosteal.



Fig. 7 - Comunicação buco sinusal decorrente do desbridamento do osso desvitalizado. Ausência de exposição óssea.




Fig. 8 - Reconstrução volumétrica após segunda intervenção.



Fig. 9 - Paciente segue em acompanhamento, ausência de sinais de recidiva ou infecções recorrentes.

CONCLUSÃO

A abordagem cirúrgica em casos de OMAM visa o controle infeccioso local e da progressão da necrose óssea, considerando que a ausência de suprimento vascular favorece a colonização bacteriana. Ressalta-se o papel do cirurgião-dentista na prevenção, diagnóstico precoce e manejo interdisciplinar da OMAM.